



### Langue de bœuf

**Chapeau :** 7 à 20 cm. Forme de "langue". Épais, mou et rouge sombre dessus.

**Dessous :** Blanc, il peut devenir rosâtre ou rougeâtre. Les tubes sont fins et non soudés les uns aux autres. En le cassant, la coupure doit être nette, pas déchirée.

**Habitat :** Souvent à la base de chênes ou de châtaigniers vivants ou morts, ou sur les souches.

**Période d'observation :** Milieu été—milieu automne.



### Oreille de Judas

**Taille :** 1 à 10 cm de large.

**Forme :** D'oreille, lisse finement feutrée plus ou moins ridée sur la face externe. Face interne mate, lisse ou avec de grosses rides.

Champignon directement fixé sur le bois (pas de pied).

La consistance est élastique.

**Habitat :** Sur le bois mort de feuillus, généralement le sureau.



### Rhodotus réticulé

**Chapeau :** 4 à 10 cm. Entièrement rose saumon. Gras au toucher car présence d'une pellicule gélatineuse séparable qui peut former comme un réseau de veines saillantes.

**Pied :** Excentré, rose pâle à blanc rosâtre. Strié.

**Habitat :** Bois mort, surtout l'orme.

**Période d'observation :** Début été—début hiver.



### Hygrocybe aurantiolutescens

**Chapeau :** Forme convexe ou conique (var subconica), fibrilleux, de couleur variable jaune orangé ou même rouge (var parapersistens).

**Lames :** Jaune-orangé.

**Pied :** Jaune fibrilleux, mais blanc à la base qui est légèrement noircissante.

**Habitat :** Prairies non fertilisées du littoral et dunes.

**Période d'observation :** Automne—hiver.



**Attention, ce livret présente notamment des champignons toxiques. Il a été élaboré pour les plaisirs des yeux, de la quête naturaliste et de l'avancée de la connaissance.**

Partagez vos découvertes sur le portail de l'Atlas de la biodiversité :

<https://atlasdelabiodiversite.lannion-tregor.com/#>



Novembre 2020



Participez à la connaissance de notre patrimoine naturel !

Sikourit lakaat anavezout hon glad naturel !



# Atlas de la biodiversité sur Lannion-Trégor Communauté



Retrouvez-nous sur :

[www.biodiversite.lannion-tregor.com](http://www.biodiversite.lannion-tregor.com)



[www.lannion-tregor.com](http://www.lannion-tregor.com)





### Lycoperdon perlée « Vesse-de-loup-perlé »

**Chapeau :** 1 à 4 cm. Blanc et mou en forme de globe ou d'ampoule.

**Pied :** Blanc, 1 à 6 cm. Peu marqué, dans le prolongement du chapeau.

Se différencie des espèces proches par des aiguillons coniques à base ronde entourés de petites verrues granuleuses. En tombant ceux-ci laissent une cicatrice ronde.

**Habitat :** Forêt, lisière et talus.

**Période d'observation :** Début été—Fin automne.



### Amanite phalloïde

**Chapeau :** 3 à 15 cm. Conique puis s'aplatit. De couleur variable, typiquement verts olive ou vert-jaune, brun-vert, parcouru de fibrilles (traits) brun-gris.

**Pied :** 5 à 20 cm, zébré de jaune verdâtre, un anneau blanc en forme de jupe qui peut disparaître. Volve enterrée en forme de sac à la base.

**Habitat :** Forêt de feuillus principalement.

**Période d'observation :** Juillet à novembre



### Bolet de fiel (ou amer)

**Chapeau :** 5 à 15 cm, brun à chamois. Dessous, les pores sont blancs puis roses.

**Pied :** S'épaissit vers la base, blanchâtre à ocre, présence d'un réseau brun formant de grosses mailles.

**Odeur :** Cèpe.

**Habitat :** Forêt de conifère.

**Période d'observation :** Milieu été—fin automne.



### Clathre rouge (ou Cœur de sorcière)

**Forme :** Cage rose-orangée à rouge vif, plus ou moins ronde formant un maillage de 7 à 20 cm. Se développe à partir d'un œuf enterré de 3 à 5 cm de hauteur formant comme un moulage alvéolé à l'ouverture.

**Ne pas confondre** avec l'œuf du Phallus qui à un aspect lisse.

**Odeur :** Cadavérique très forte.

**Habitat :** Sur les broyats dans les massifs d'ornement.

**Période d'observation :** Milieu printemps—milieu automne.

### Léotie lubrique

**Chapeau :** 0,5 à 2 cm. Forme arrondie, lobée ou aplatie. Sans lames, ni plis. Jaune verdâtre, aspect gélatineux, entièrement visqueux.

**Pied :** Même couleur, ou plus jaune.

**Habitat :** Feuillus et conifères dans la mousse....en mélange quelquefois avec les chanterelles en tube.

**Période d'observation :** Fin d'été—fin automne.



### Gymnopile remarquable

**Chapeau :** 2 à 25 cm (quelque fois jusqu'à 35 cm). Fibrilleux puis écailleux en vieillissant, de couleur ocre à roussâtre. Lames échancrées à adnées (ne descendent pas sur le pied) jaunes puis rouille.

**Pied :** Même couleur que le chapeau, fibrilleux avec un anneau ample qui protège longtemps les lames en restant attaché à la marge du chapeau avant d'être libéré par l'épanouissement de ce dernier.

**Habitat :** En touffe sur les souches ou sur du bois de feuillus.

**Période d'observation :** Septembre à décembre



### Hygrocybe perroquet


**Chapeau :** 0,8 à 5 cm. Aspect entièrement visqueux et remarquablement bariolé.

Couleur variable, nuance de vert, décolorant vers l'orangé/jaune et parfois bleuté. La marge du chapeau est striée. Les lames, plutôt pâles à jaune/vert, ne descendent pas sur le pied.

**Pied :** Très visqueux, variable en couleur comme le chapeau, souvent vert au sommet.

**Habitat :** Prés et pelouses non fertilisées et jardins.

**Période d'observation :** Automne.



### Clitocybe odorant

**Chapeau :** 3 à 9 cm. Bleu-vert à gris-vert, décolorant avec l'âge. Les lames blanc crème à verdâtres descendent à peine sur le pied.

**Odeur :** Pure et puissante d'anis.

**Habitat :** Forêts et haies.

**Période d'observation :** Milieu été—fin automne.

**Ne pas confondre avec :** Le Clitocybe anisé strié : Odeur forte d'anis mais il est beige rosé et la marge du chapeau est striée.



### Clavulinopsis corniculata

Forme de buisson ramifié de couleur jaune. Dernier élément en forme de U. La chair est fragile.

**Largeur :** 1,5 à 6 cm.

**Hauteur :** 0,5 à 4 cm.

**Habitat :** Au sol dans les prairies et pelouses non fertilisées et forêts.

**Période d'observation :** Automne.

**Ne pas confondre avec :** La Calocère visqueuse : Chair caoutchouteuse, pousse sur du bois plus ou moins pourri.

